


Points clés

- Différents facteurs issus de l'enquête constituent des pistes pour **déstigmatiser les pratiques** :



Nous contacter

✉ kevin-marc.valery@u-bordeaux.fr

✉ antoINETTE.prouTEAU@u-bordeaux.fr

Travaux de l'équipe

<https://labpsy.u-bordeaux.fr/>

- Fournier, T., Guionnet, S. et Prouteau, A. (2020). *Les stéréotypes des différentes maladies mentales en France : enquête en population générale*. Document non publié. Université de Bordeaux.
- Valery, K.M., Guionnet, S. et Prouteau, A. (2021). *Stigmatisation de la schizophrénie chez les professionnels en santé mentale : revue de la littérature internationale*. Document non publié. Université de Bordeaux.
- Valery, K.M., Guionnet, S. et Prouteau, A. (2021). *Stigmatisation de la schizophrénie lors du parcours de soin : une enquête chez les usagers et familles*. Document non publié. Université de Bordeaux.
- Yvon, F. et Prouteau, A. (2019). *Enquête sur les croyances autour de la schizophrénie en France*. Document non publié. Université de Bordeaux.

Source

Valery, K.-M., Violeau, L., Fournier, T., Yvon, F., Arfeuillere, S., Bonilla-Guerrero, J., Caria, A., Carrier, A., Destailats, J.M., Follenfant, A., Laberon, S., Lalbin-Wander, N., Martinez, E., Staedel, B., Touroude, R., Vigneault, L., Roux, S., & Prouteau, A. (soumis). "Part of the solution yet part of the problem" *Stigmatization in mental health professionals: characteristics and associated factors*.

Références

- Mestdagh, A. et Hansen, B. (2014). Stigma in patients with schizophrenia receiving community mental health care : a review of qualitative studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 49(1), 79-87. doi : 10.1007/s00127-013-0729-4
- Valery, K.M. et Prouteau, A. (2020). Schizophrenia stigma in mental health professionals and associated factors : a systematic review. *Psychiatry research*. doi : 10.1016/j.psychres.2020.113068

Remerciements

Plaquette réalisée en 2021 par Sarah Guionnet.

Caiada, M., Dallagi, M., Felix, S., Fournier, T., Hernandez-Comte, A., Violeau, L., & Yvon, F.



Stigmatisation de la schizophrénie chez les professionnels en santé mentale : enquête en France

Programme de recherche
« STIGMA »

Pr. A. Prouteau

Enquête menée dans le cadre du [travail doctoral de K-M. Valery](#)

Contexte

La schizophrénie est une des maladies mentales les plus stigmatisées (Valery et Prouteau, 2020). Même si les professionnels de santé mentale rapportent moins de croyances stigmatisantes que d'autres groupes sociaux (Valery et Prouteau, 2020) ; les services de santé mentale sont une source de stigmatisation (Mestdagh et Hansen, 2014).

Objectif

Une enquête en France a été réalisée pour :

Identifier les facteurs (socio-démographiques, professionnels contextuels, professionnels individuels et croyances théoriques) associés à la stigmatisation de la schizophrénie (cf. figure 1) chez les professionnels de santé mentale.

Méthode

Enquête en ligne auprès de 357 professionnels de santé mentale (e.g. psychiatres, psychologues, infirmier(e)s) travaillant ou ayant travaillé auprès de personnes souffrant de schizophrénie.

Recrutement réalisé via les réseaux sociaux ou professionnels.



Figure 1. Mesures de la stigmatisation.

Résultats




Figure 2. Facteurs associés à la stigmatisation chez les professionnels de santé mentale français.

NB : *POR = Pratiques Orientées Rétablissement.

En gras = facteurs les plus associés à moins de stigmatisation chez les professionnels.

- Les facteurs socio-démographiques et professionnels contextuels (cf. figure 2) ont peu d'influence sur la stigmatisation chez les professionnels.
- Les croyances théoriques et les facteurs professionnels individuels sont ceux qui en ont le plus.



- Quels sont les facteurs les plus fortement associés à moins de stigmatisation chez les professionnels de santé mentale français ?
- Avoir des pratiques orientées rétablissement (associé à moins de stéréotypes, de préjugés et de discrimination).
- Se sentir utile dans son travail (associé à moins de stéréotypes et de discrimination).
- Percevoir des similitudes entre soi et les personnes qui souffrent d'une schizophrénie (associé à moins de stéréotypes, de préjugés et de discrimination).



- Avoir des croyances en continuum (i.e. penser la schizophrénie comme l'expression plus intense et plus fréquente de comportements existants dans la population générale ; est associé à moins de désir de distance sociale).